



# 10 sinais de alerta

para Imunodeficiência Primária

ADULTOS

- 1 Duas ou mais novas otites no período de 1 ano
- 2 Duas ou mais novas sinusites no período de 1 ano na ausência de alergia
- 3 Uma pneumonia por ano por mais de 1 ano
- 4 Diarreia crônica com perda de peso
- 5 Infecções virais de repetição (herpes, verrugas ou condiloma)
- 6 Necessidade do uso de antibiótico intravenoso de repetição para melhora das infecções
- 7 Abscessos profundos de repetição na pele ou em órgãos internos
- 8 Monilíase persistente ou infecção fúngica invasiva
- 9 Infecção por *Mycobacterium tuberculosis* ou atípica
- 10 História familiar de imunodeficiência primária

Adaptado de: Fundação Jeffrey Modell.

**O diagnóstico precoce de IDP é crucial para o prognóstico do paciente.**





# 10 sinais de alerta

para Imunodeficiência Primária

## CRIANÇAS

1

Quatro ou mais novas otites no período de 1 ano



6

Abscessos recorrentes



2

Duas ou mais sinusites graves no período de 1 ano



7

Estomatite ou candidíase oral ou cutânea por mais de 2 meses



3

Uso de antibióticos por 2 meses ou mais com pouco efeito



8

Necessidade de antibiótico endovenoso para combater infecções



4

Duas ou mais pneumonias no período de 1 ano



9

Duas ou mais infecções sistêmicas incluindo sepsis



5

Dificuldade para ganhar peso ou crescer normalmente



10

História familiar de imunodeficiência primária



Adaptado de: Fundação Jeffrey Modell.

**O diagnóstico precoce de IDP é crucial para o prognóstico do paciente.**

